

Pool preguntas Anatomía

¿Cuál/es de las siguientes parejas compuestas de un nervio y un nivel medular del que procede SÍ es/son correctas?

1. Nervio subclavio—C5
2. Nervio cutáneo antebraquial lateral—T1
3. Nervio pectoral lateral—C6
4. Nervio axilar—C8
5. Nervio cutáneo braquial medial—C6

¿Cuál/es de los siguientes músculos produce/n flexión de la articulación del codo?

1. Braquiorradial
2. braquial
3. Coracobraquial
4. Flexor profundo de los dedos
5. Redondo mayor

¿Cuál/es de las siguientes estructuras atraviesa/n el tabique intermuscular medial del brazo?

1. Arteria colateral cubital superior
2. Nervio mediano
3. Vena basílica
4. Nervio cutáneo antebraquial medial
5. Nervio cubital

¿En cuál/es de las siguientes localizaciones pueden encontrarse los nervios de la extremidad superior?

1. Nv cubital medialmente a la arteria cubital
2. Nv cutáneo antebraquial medial en el espesor del músculo coracobraquial
3. Nv axilar anterior a la arteria axilar
4. Nv radial en la cara posterior del húmero
5. Nvsupraescapular en la fosa subescapular

¿Cuál/es de los siguientes tendones se encuentra/n en el quinto compartimento del retináculo extensor del carpo?

1. Tendón del ms abductor largo del pulgar
2. Tendón del ms extensor radial corto del carpo
3. Tendón del ms extensor del meñique
4. Tendón del ms extensor cubital del carpo
5. Tendones de los músculos extensores de los dedos

¿Cuál/es de las siguientes funciones no realiza el músculo esternocleidomastoideo?:

1. Extensión de la cabeza
2. Elevación del hombro
3. Rotación contralateral de la cabeza

4. Rotación ipsilateral de la cabeza
5. Colabora en la inspiración forzada

¿Cuál/es de los siguientes músculos extiende/n la cabeza?

1. M largo del cuello
2. M largo de la cabeza
3. M semiespinoso de la cabeza
4. M recto anterior de la cabeza
5. M multífido cervical

¿Cuál/es de las siguientes arterias no es /son habitualmente ramas del tronco tirocervical de la arteria subclavia?:

1. A supraescapular
2. A torácica interna (mamaria interna)
3. A vertebral
4. A cervical transversa (transversa del cuello)
5. A cervical ascendente

¿Cuál/es de las siguientes estructuras cruza/n superficialmente a su pareja?

1. El nervio femoral a la arteria circunfleja femoral lateral
2. La arteria femoral al nervio safeno
3. El nervio mediano a la arteria braquial
4. El tendón del m extensor radial corto del carpo al tendón del extensor corto del pulgar
5. La arteria cubital al m pronador redondo

Uno o dos de los siguientes músculos son inervados por el nervio plantar lateral. Señálelos:

1. M. aproximador del dedo gordo
2. M cuadrado plantar
3. Primer y segundo lumbricales
4. M flexor plantar corto
5. M abductor del dedo gordo

(V) La vena cefálica atraviesa la fascia clavipectoral

(V) La arteria dorsal de la escápula se relaciona con el borde medial de la escápula

(F) La sensibilidad de la uña del dedo pulgar es recogida por el nervio radial

(V) La inervación del recto del abdomen depende exclusivamente de los nervios torácicos T7-T12

(V) Las ramas cutáneas del plexo cervical emergen por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo

(F) El paso de la vena cava inferior a través del diafragma se produce a nivel T10

(F) El nervio torácico largo nace de las divisiones posteriores del plexo braquial

Preguntas cortas

Enumere las ramas de la arteria cubital de proximal a distal

Pregunta larga

Trayecto y relaciones del nervio radial desde la axila hasta el codo.